

# DIRİM

*kültür - sanat - güncel yaşam*



Mehmet Yılmaz

# Epidosin compositum®

Valethamat bromid + Parasetamol

## Sınırsız Özgürlüğe Doğru Bileşimindeki

**Valethamat Bromid ve Parasetamol İle;  
Gastrointestinal Sistem, Genito-Üriner Sistem,  
Safra Kesesi ve Safra Yolları Üzerinde  
Güçlü Spazmolitik Etki Yanında  
Güçlü Analjezik Etkiye Sahiptir.**

**Farmülü:** 1 Drajole Etkin madde: 10 mg Valethamat Bromid 325 mg Parasetamol. **Yardımcı madde:** Tiamidolol, şeker. **Farmakoloji, özellikleri:** Epidosin Compositum'un en önde gelen farmakolojik etkisi içinde bulunan Valethamat Bromid'in etki organları düz adelelerine olan antispazmotik tistir. Bu tistir analjezik komponent olan Parasetamol ile tamamlanır. Parasetamol analjezik ve antipiretik özelliktedir, gastro-intestinal kanaldan hemen absorbe edilir ve oral kullanımdan sonra maksimum plazma konsantrasyonuna 10-30 dakika sonra ulaşır. **Endikasyonları:** Epidosin Compositum'un bileşiminde bulunan Valethamat Bromid, düz adeleleri gevşetici, parasetamol ise ularının ve vücutta ganglionları inhibe edicidir. Parasetamol ögri giderici olarak tistir eder. İdrar yolları ve safra taşları kolikleri, mide üşeri ağrıları, mide barsak kanalıının diğer krampti halleri, kolik şeklinde ağrıları birlikte olan spastik konstipasyonlar, fensizler, postoperatif ağrılar, dismenore, lumbago, **Kontraindikasyonları:** İleri derecede karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, akut dözensiz porfirialarda ve megakolonularda kullanımı kontraindikedir. **Uyarılar/Önemler:** Glukom, organik pilor stenozu, prostat hipertrofisi ve idrar retansiyonu hallerinde dikkatle kullanılmıdır. Parasetamol plasentaya ve anne sütüne geçmektedir bu nedenle hamileler ve emzirilerde dikkatle kullanılmıdır. **Yan etkileri/Advers etkileri:** Parasetamolün, hematolojik reaksiyonlar, organözümlöz, parkinsonizis, cilt reaksiyonları ve bazı alerjik reaksiyonlar yapılabilmektedir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BASVURUNUZ. İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler:** Birleşiminde bulunan Parasetamolden dolayı, Kloramfenikol, Warfarin sodyum ve Zidovudin ile etkileşim gösterir. **Kullanım şekli ve dozu:** Günde 3 kere 1 tableti öğlenlerden yutulur, en iyisi yemeklerden sonra alınmalıdır. Doz aşımı halinde olmaacak tedaviler ve antidotları: Aşırı dozdan dolayı kusma, bulantı, jiddetli karın ağrısı ve anoreksia görüldüğünde mide yıkanmalıdır ve asitilistein verilmelidir. **Ticari taktim şekli ve ambolajı muhteva:** 20 Drajelik blister. İlaçları çocukların erişemeyeceği yerde, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambolajında saklayınız. Doktorla danışmadan kullanmayınız. **Ruhsat sahibi:** Dr.F. Fak. İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul. **Ruhsat kağıdı ve no:** 13.2.1985-138/89. **İmal yeri:** Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/İstanbul. **Reçete ile satılır.**

