

ISSN 0378 - 8628

# DIRİM

Tıp Gazetesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2007

Yıl: 82 Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)



Türkiye'nin en eski tıp gazetesi Dirim'i, Dr. Feridun Frik'ten devralıp,  
bugünlere taşıyan değerli büyüğümüz  
Sayın MEHMET GÜNER FRİK'i  
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Hepimizin başı sağolsun.

DİRİM TIP GAZETESİ

# DIRİM

Tıp Gazetesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2007

## içindekiler

### Kurucusu

Dr. Feridun Frik

### Sahibi

Dr. F. Frik İlaç San. ve  
Tic. A.Ş. adına  
Güner Frik

**Genel Yayın Yönetmeni ve  
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü**  
Erol Frik

### Genel Koordinatör

Dr. Burcu Ataman

### Yayın Koordinatörü

Özge Altay

### Görsel Yönetmen

Levent Yılmaz

### Reklam ve Halkla İlişkiler

Derya Telci

### Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ercan Abay  
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  
Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Cüneyt Aytekin  
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  
Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin Ergen  
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  
Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan Göçmen  
Hacettepe Üniversitesi,  
Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve  
Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi  
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fazilet Karakoç  
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özgür Kasapçopur  
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk  
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cem Kopuz  
19 Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  
Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Halil Koyuncu  
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa  
Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur Özçelik  
Hacettepe Üniversitesi,  
Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve  
Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Oğuz Poyanlı  
Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim  
ve Araştırma Hastanesi,  
Ortopedi Kliniği

Dr. Ülkümen Rodoplu  
Dr. Nevval Salih İlgören Devlet  
Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü  
Prof. Dr. Murat Buncer  
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Tel: 0216 388 32 75  
e-mail: frik@frik.com.tr  
DIRİM/Nisan-Mayıs-Haziran 2007

### Derlemeler, Araştırmalar, Olgu Sunumu...

**343** Pnömatosis Kistoides Intestinalis  
*Ali Şahin*

**350** Histerektomi ve Benlik Saygısı  
*Ümrân Sevil, Süreyya Bulut*

**357** Akut Miyokard Enfarktüsünde Streptokinaz  
Tedavisinin CK-MB, EKG ve Göğüs Ağrısı Üzerine  
Etkisi  
*Rahmi İrmak, Hasan Kılıç, S. Ahmet Akın,  
Özgür Keşkek*

**362** Ependimomalar  
*Hülağü Kaptan, Ömür Kasımcı,  
Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç*

**368** Gebe Kadınların, Gebelik Döneminde Cinselliğe  
İlişkin Bilgi ve Görüşleri  
*Nevgül Demir, Nevhayat Tulay*

**376** Travma Öyküsü Olmayan Genç Hastada  
Tuberositas Tibia Fraktürü  
*Murat Orak, Mehmet Üstündağ, Cahfer Güloğlu,  
Mustafa Burak Sayhan, Şervan Gökhan*

### i Tıp Dünyasından...

**xi** Kaybettiklerimiz...

**xii** Gündem... Olan Bitenler...

**xiv** Geçmiş Zaman Yaprakları...

### Kültür ve Sanat...

**II** Sinema  
*Ferzan Özpetek*

**VI** Tiyatro  
*Ali Poyrazoğlu*

**VIII** Resim  
*Matisse*

**XIV** Gezi  
*Viyana*

**XVIII** Kitap  
*Arthur İle Minimoylar*

Baskı Ön Hazırlık Grafik Tasarım ve Uygulama: Ağustos Reklam Ajansı Limited Şirketi

Tel: 0216 340 51 56 Faks: 0216 340 51 59 www.agustos.com

Baskı: Ali Rıza Baskan, Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. Yenibosna Değirmenbahçe Cad. No:59 Bahçelievler- İstanbul

Baskı Tarihi: Haziran 2007

#### Merkez

Ankara Bürosu

Zmir Bürosu

Antalya Bürosu

Samsun Bürosu

Adana Bürosu

İstanbul Bürosu

Marmara Bürosu

Diyarbakır Bürosu

Bursa Bürosu

Erzurum Bürosu

Trabzon Bürosu

Azerbaycan Bürosu

Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:22 34854 Küçükyalı-İstanbul

Oğuzlar Mah. Birinci Cad. 37. Sok. Eroğlu Apt. No:5/8-9 Balgat-Ankara Tel: 0312 284 66 54

Kemal Paşa Cad. No:26 Selçuk Ecza Deposu Binası Kat:3 İşikent-Zmir Tel: 0232 472 04 80

Toros Mah. Atatürk Bulvarı M. Aygün Apt. No:90/9 Kat:3 Antalya Tel: 0242 229 48 36

Gazi Cad. Orhaniye Geçidi Güneş Han No:6/4 Samsun Tel: 0362 532 78 37

Güzelyalı Mah. 28. Sok. Servet Apt. No:1 K:2/6 Seyhan-Adana Tel: 0322 232 37 13

Ali Rıza Gürcan Cad. Alpaşan İş Merkezi No:30 K:6 D:23 Merter-İstanbul Tel: 0212 483 43 98-99

Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Sakarya Sok. No:3 Küçükyalı-İstanbul Tel: 0216 518 52 39

Kayapınar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. Suvarı 1 Apt. D:1 Diyarbakır Tel: 0412 252 11 64

Çamlıca Mah. Akarsu Sok. 3. Platin Sitesi J Blok No:12/1 Nilüfer-Bursa Tel: 0224 453 25 81

Osman Bektaş Mah. Selin Sitesi E Blok D:2 Kayakyolu Palandöken-Erzurum Tel: 0442 317 00 23

2 No'lu Beşirli Mah. Devlet Sahilyolu Cad. Turankardeşler Apt. No:485 Kat:2 No:3 Trabzon Tel: 0462 223 03 46

Teymur Aliyev Küçesi 65 1069 Bakü Tel: 00 99 412 561 40 32

## **Bir varmış, bir yokmuş.**

Her insanın hayatı aslında bir masal gibidir. Bazılarınıninki anlatmaya değer bir masaldır. Bu masal da onlardan biri...

Güner Frik'in masalı 1925 yılında İzmit'te başlar. Babası daha yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Tıbbi doktorlarından Feridun Frik'tir. Feridun Bey'in adı daha sonra kendi kuracağı ilaç firması ile eşleşecek ve bugün bizim bildiğimiz Dr. F. Frik İlaç Sanayi A.Ş. olarak varlığını sürdürecektir.

Güner Frik çocukluğunu Cağaloğlu ve Sultanahmet'te geçirir, okula orada gider ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirir. Yaşadığı semt dolayısı ile pekçok değişik branşta ünlü olmuş kişilerle dostluk kurar ve onlarla arkadaş olur. Sadri Alışık, Halit Kıvanç, Ruhi Sarialp, Prof. Dr. Tank Minkari, Prof. Dr. Selim Yalın, Ayduk Koray ve sınıf arkadaşı Necmettin Erbakan akla ilk gelenlerdir.

O yıllarda bilgisayar, internet ve televizyon gibi çağın nimetleri henüz olmadığından Güner Frik enerjisini spora verir. Daha ilkokul çağlarında ele avuca gelmez yerinde duramayan bir çocuktur. Büyükannesinin Sultanahmet'te tren yolunun yanındaki evinde ilk üç adım denemelerini yapmakta ve evden üç adımda tren yoluna kadar atlayarak evdekilerin yüreğini ağzına getirmektedir. Boş arsalarda toprak ve kum içerisinde arkadaşları ile beraber atletizm yarışmaları düzenlerler. Yüksek atlama bunların içerisinde onda hayatının sonuna kadar atladıktan sonra sert kum havuza düşmekten dolayı disk fitiği, bel ağrısı ve hafif eğrilen belkemiği şeklinde bir iz bırakacaktır. Atletizmin tüm branşlarını sevmekle beraber 3 adım onun favorisi olmuş ve 23.09.1945 yılında 14.78 metre ile Türkiye rekorunu kırmıştır. Arkadaşı Ruhi Sarialp ile daha sonra bu rekor değişik tokuş şeklinde birkaç kere daha santim santim kırılacak ve Ruhi Sarialp'in Güner Bey'e "Santim Düşmanı" lakabını takmasına sebep olacaktır.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirince baba mesleği olan Tıp Doktorluğu tahsili yapmak için İsviçre'ye giden Güner Frik maalesef İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ekonomik olumsuzluklar yüzünden tahsilini bitiremeden yurda döner ve babasının kurmuş olduğu ilaç şirketinde çalışmaya başlar.

Dr. Feridun Frik ilaç firması savaşın bitmesini takiben 1947 yılında kurulmuş olup Bayer Alman İlaçlarının Türkiye Mümessilliğini yapmaktadır. Aspirin o yıllarda Dr. Feridun Bey sayesinde Türkiye'de tanınır.

Ancak satışı belli bir seviyeye ulaşan her çok uluslu firmanın yapacağı gibi Bayer firması da Türkiye'de kendi başına ofis kurmak isteyince 1964 yılında Dr. Feridun Frik İlaç şirketi Bayer'den ayrılır. Şirketin yönetimi yavaşça Güner Bey'e geçmeye başlar. Güner Bey aynı yıl hem annesini kaybetmenin acısı hem de şirkete yeni lisansör firma arayışı içinde zor günler geçirir. Bu yıllarda yapılan temaslar sonucu Kali Chemie firması bulunur ki daha sonra Solvay Pharma tarafından satın alınan bu firma bugün hala lisansörlüğünü yaptığımız firmalardan biridir.

1970'li yıllar Pankreoflat, Peracon, Pansan, Pankreon, Propycil gibi bugün çoğu hala pazarda bulunan ürünlerin her birinin ruhsat dosyalarının Güner Bey tarafından teker teker daktilo makinesi ile yazılarak alındığı yıllardır.

1980'li yıllara gelindiğinde şirket büyümüş ve Güner Bey'e yardımcı olarak Eczacı Selahattin Badur devreye girmiştir. Güner Bey, Selahattin Bey'in şirketin her konusunda kendisine yardımcı olduğu bu yıllarda çok sevdiği spor ve olimpiyat faaliyetlerine daha fazla vakit ayırabilmiştir. Bu yıllarda Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Yönetim Kurulu Üyeliği, EOC Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Finans Komisyonu Başkanlığı, EOC Yönetim Kurulu Ömür Boyu Üyeliği, Türk Spor Vakfı Kuruculuğu ve Dönem As Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev alıp 1991 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilebilecek en yüksek nişan olan IOC Olympic Order gibi bir ödüle layık görülmüştür.

1980'li yılların sonu Güner Bey'in 1970'li yılların başında Kanada'ya okumak için gidip Türkiye'ye dönmeyen oğlunu bir şekilde Türkiye'ye geri getirmeye ve onu şirkete devam ettirmesi için ikna etmeye çalıştığı yıllardır. En nihayet oğlunu ikna etmeyi başaran Güner Bey artık 1990'lı ve 2000'li yılları oğlu ile beraber şirkete yöneterek geçirecektir.

Her baba oğulun arasında olduğu gibi bu baba oğulun arasında da görüş ayrılıkları olsa da neticede şirket büyüyecek ve hakettiği yere ulaşacaktır.

Bu masalın en güzel tarafı sonunda Güner Bey'in onun kıymetini beraber olduğu her dakika anlayan oğlu ile son 20 yıla yakın zamanı mutlu bir şekilde geçirmesidir.

Ama her masalın, her ne kadar güzel olursa olsun, muhakkak bir sonu vardır.

Bu masal 16 Haziran 2007 günü güzel bir yaz gecesi bitti. Güner Bey en sevdiği arkadaşlarının içinde en istediği ve hep arzu ettiği gibi çekmeden ve çektirmeden pırıl pırıl giyimli bir akşam yemeği sonrasında babalar gününden bir gece evvel kimseye haber vermeden aniden bizi terk etti.

Şimdi bize düşen onun rüyasını yaşatmaya devam etmek ve kendi masalımızı yazmak.

Bir varmış bir yokmuş.

Erol Frik

# Cabral®

Feniramidol HCl

## Gevşetin



### Miyorelaksan ve Analjezik Etki



**Cabral® draje - ampul / Formülü: 3 ml – 1 ampul.** Etken madde: 800 mg Feniramidol HCl **1 draje:** Etken madde: 400 mg Feniramidol HCl **Farmakolojik Özellikleri:** Cabral, beyin ve medulla spinaliste polysinaptik refleksi blokajı etmek suretiyle, ağrı kasılma zincirini yıkar. Bu suretle adale gerginliklerini giderir, adale ağrılarından kuvvetli analjezik etki yapar. Manifest spazmik refleksleri etkilemez. Miyorelaksan ve analjezik olarak Cabral, sırt ağrı adale ve hareket sisteminin diğer yapılarında akut ve kronik ağrıların tedavisinde etkilidir. **Endikasyonları:** Bel ağrısı, lumbago, sırt ağrı, disk rahatsızlıkları ve medika-mekanik veya 'stropatik, mesela şu alt mesajları gibi diğer tedavileri destekleyici olarak kullanılır. Adalelerdeki gerginlikleri giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet adalesinin fonksiyonunu sağlar. **Kontraindikasyonları:** Preparatın bileşiminde yer alan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır. **Uyarılar / Önlemler:** Cabral draje; Antikoagülanlarla birlikte alındığında kanama, oral antidiyabetiklerle karbonhidrat metabolizmasında değişiklik, antikonvülsiflerle göz titremesi, görme bozuklukları, koordine olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabral'in kesilmesi ve doktora gidilmesi tavsiye olunur. İlaçlarda boyar madde olarak kullanılan Tartrazine ilimlerin altında olduğu halde hassasiyeti reaksiyonu gösterme potansiyali bulunduğundan dikkatle kullanılması tavsiye edilir. **Cabral ampul;** adale zerklerinde iyi tahammül edilir. Nadir olarak zerkten sonra baş dönmesi sersemlik olabilir.

Bu sebeple zerklerden sonra 1 saat istirahat tavsiye edilir. Başka tedaire gerek yoktur. **Yan Etkiler / Advers Etkiler:** Nadiren alerjik reaksiyonlar görülür. Bazı hassas hastalarda mideye dolgunluk veya bulantı, dilde yanma duygusu veya deri kızamığı olabilir. Fakat cabrak geçicidir, vücutluk, kaşıntı ve deri döküntüleri görülebilir. Eğer hipersensitivite veya deri döküntüleri oluyorsa ilaç verilmesi durdurulur. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.** İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimleri: Cabral draje; kumarin derivatları (antikoagülanlar), talbutamid, oral antidiyabetik ve difenilhidantoin ile tedavi gören hastalarda, bu ilaçların etkilerini artıracağından dikkatle kullanılmalıdır. **Kullanım Şekli ve Dozu: Cabral draje;**

Günde 3 kere 1-2 draje, yemeklerden sonra alınmalıdır. **Cabral ampul;** Günde 1 ampul gluteo içine derin zerk edilir. **Doz Aşımı ve Tedavisi:** Günlük doz, 3200 mg'a kadar iyi tolere edilmektedir. Ancak ilaca bağlı herhangi bir semptom görülür ise doktora danışılmalıdır. **Ticari Takdim Şekli ve Ambalajı:** 24 drajelek blister ambalajlarda. KDV Dahil P.S.F.: 7,78.- YTL (Eylül 2006). Her bir kutuda; 3 ml'lik 3 ampul. KDV Dahil P.S.F.: 3,46.- YTL (Eylül 2006). **Saklama Koşulları:** 25°C'nin

altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktoru danışmadan kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. İSTANBUL. **İmal Yeri:** Cabral draje; Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. Tic.

A.Ş. Erenyurt/İstanbul. **Cabral ampul;** Mezar İlaç San. A.Ş. Kartal/İSTANBUL. **Ruhsat Tarihi ve No:** Cabral

**draje;** 11.11.1970 - 106/12. **Cabral ampul;** 11.11.1970 - 106/14. **Reçete ile satılır.**



# Mictonorm®

Propiverin Hidroklorür



idrar kaçırma  
tedavisinde yeni bir **norm**

Formülü: Her draje, Etken madde: 15 mg propiverin hidroklorür içerir. Farmakodinamik Özellikler: Kalsiyumun içeri alımının inhibisyonu ve muskültropik spazmolizise neden olan mesane düz kas hücreleri arası kalsiyumun düzenlenmesi ve antikolinergik etkiye bağlı olarak pelvik sinirin efferent bağlantısının inhibisyonudur. Endikasyonlar: Gerek idiyopatik detrusör aşırı aktivitesine bağlı, gerekse omulitik yaralanmalarına bağlı nörojenik detrusör aşırı aktivitesi, örneğin transvers lezyon paraleli olan hastalarda ani idrar sıkışması ve sık idrara çıkma gibi, idrar tutamama problemlerinin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonlar: İlaç, aktif maddeye ya da herhangi bir yardımcı maddeye aşırı hassasiyet gösteren hastalarda, bağırsak obstrüksiyonu, üriner retansiyonun beklendiği önemli dereceli mesane obstrüksiyonu, miyastenik gravis, intestinal atoni, ciddi ülseratif kolitis, toksik megakolon, kontrol edilememiş kapalı açılı glomok, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer yetmezliği, taşıtarımı Uyanlar/Önemli: Otonomik nöropati şikayeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki hastalıkların semptomları, ilaç alımı takiben şiddetlenebilir: ciddi konstif kalp yetmezliği, prostatik hipertrofi, reflü özofajit ile hiatus hernisi, kardiyak aritmi, taşikardi. Diğer antikolinergikler gibi, propiverin, midriyaziye'e neden olur. Bundan dolayı, anterior odanın ön açılı ile yatkinlik kazanmış bireylerde akut kapalı açılı glomokma neden olma riski artabilir. Organik mesane hastalıklarına bağlı olduğu kadar, böbrek hastalıkları ve konstif kalp yetmezliğine bağlı pollakiuri ve nokturiye tedaviden önce hüküm verilmelidir. Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı: Gebelik Kategorisi: C Propiverin hidroklorür hamilelik sırasında kullanılmamalıdır ve emziren kadınlara verilmemelidir. Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkileri: Hastanın bir motorlu taşıt ya da başka bir makine kullanmak gibi zihinsel uyanıklık gerektiren aktiviteleri yapma kabiliyetini ya da bu ilacı kullanırken tehlike olabileceği yapma kabiliyetini azaltabilir. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Ağzı kuruluğu, anormal akomodasyon, kabızlık, yorgunluk, akomodasyon, bulantı/kusma, baş dönmesi, titreme, idrar retansiyonu, kızama, uyusuklukla beraber düşük kan basıncı, aşırı duyarlılığa ya da hipersensitiviteye bağlı lekeleme, çarpıntı, huzursuzluk, konfüzyon. Tüm istenmeyen etkiler geçicidir ve bir doz indirimi ile ya da terapinin sonlandırılmasından maksimum 1-4 gün sonra yok olur. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler: Trisiklik antidepressanlar, antikolinergikler, amantadin, nöroleptikler ve beta-adrenoseptör agonistler ile birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri artar. Kolinergik ilaçlarla birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri azalır. İsoniazid ile tedavi edilen hastalarda kan basıncını düşürür. Metoklopramid gibi prokinetiklerin etkisi azalabilir. Sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) tarafından metabolize edilen diğer ilaçlar ile farmakokinetik etkileşimler olabilir. Propiverin, zayıf bir sitokrom P450 3A4 inhibitörü olarak düşünülebilir. Kullanım şekli ve dozu: Günde iki defa bir standart draje dozu tavsiye edilmektedir, bu doz günde üç defaya kadar çıkartılabilir. Doz Aşımı: Aşırı dozun tedavisi, yetişkinlerde 1.0 ila 2.0 mg yavaş intravenöz enjeksiyon (eğer gerekirse toplam 5 mg'a kadar tekrar edilebilir) dozu ile atropin aşırı doz alımının tedavisinde olduğu gibi, kusmanın ya da gastrik lavajın başlatılmasını takiben semptomatik ve destekleyici tedaviyi içerebilir. Saklama Koşulları: 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ticari Takdim Şekli, Ambalaj Muhtevası ve Fiyatı: Mictonorm 15 mg 56 draje, blister ambalajlarda, KDY Dahili P.S.F: 67.00 YTL. (Ekim 2006). Ruhsat Sahibi: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22 34654 Küçükyalı-İSTANBUL Ruhsat Tarih ve Numarası: 04.04.2006 119/77 İmal Yeri: APOGEPHA Arznelmittel GmbH Dresden, Almanya Reçete ile satılır.



## Değerli Hekim Meslektaşlarım,

01 Ocak 2005 itibariyle DİRİM TIP GAZETESİ yayın kabulünde bazı şartlar uygulamaya koymuştur. Hakemli dergi olmak ve uluslararası arenalarda boy göstermek adına alınmış bu kararları sizler sayesinde gerçekleştirebilirsek hepimizin dergisi olan DİRİM böylece hak ettiği yere ulaşmış olacaktır.

Göstereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim.

Dr. Burcu ATAMAN

Genel Koordinatör

Dirim dergisi, genel tıp alanındaki araştırmaları, ilginç olguları ve derlemeleri yayımlar. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olması ve derginin "Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurulu"nun onayını alması gerekmektedir. Yazılar orijinali ve 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha şeklinde gönderilmelidir. Beraberinde tüm yazı ve şekilleri içeren bir disket de bulunmalıdır. Düzeltme istenen yazılarda, yazının düzeltilmiş halini içeren bir disket de tekrar ayrıca gönderilmelidir. Araştırma ve derlemeler en fazla 10 sayfa olmalı, olgu bildirimleri ise 5 sayfayı geçmemelidir. Yazılar bir başvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

### Yazıların Hazırlanması

Yazılar standart dosya kağıdına daktilo veya bilgisayar ile, sayfanın sadece bir yüzüne olacak şekilde, iki aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında yaklaşık üçer santim boşluk bırakılmalıdır. Yazılar, Başlık sayfasından başlamak üzere ve sağ alt köşede olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

### Yazılarda bulunması gereken kısımlar şunlardır:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| A) Araştırmalar için:    | B) Olgu bildirimleri için: |
| 1. Başlık sayfası        | 1. Başlık sayfası          |
| 2. Türkçe özet           | 2. Türkçe özet             |
| 3. İngilizce özet        | 3. İngilizce özet          |
| 4. Giriş                 | 4. Giriş                   |
| 5. Gereç ve Yöntemler    | 5. Olgu bildirisi          |
| 6. Bulgular              | 6. Tartışma                |
| 7. Tartışma              | 7. Kaynaklar               |
| 8. Kaynaklar             | 8. Tablolar                |
| 9. Tablolar              | 9. Şekil ve Fotoğraflar    |
| 10. Şekil ve Fotoğraflar |                            |

**Başlık sayfası:** Çalışmanın adı Türkçe ve İngilizce ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt alta yazılmalıdır. Yazarların açık adı-soyadı, unvanları, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum belirtilmelidir. Yazılacak yazarın posta adresi ile telefon, faks ve elektronik posta adresleri yazılmalıdır.

**Özet:** Başlık sayfasından sonra, ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için en fazla 150 kelimeyi, olgu bildirileri için 50 kelimeyi aşmayan bir özet bulunmalı, özet incelemenin amacını, kullanılan yöntemleri, temel bulguları ve sonucu kapsamalıdır. Türkçe özetin altında aynı içeriği kapsayan İngilizce özet yer almalıdır. Her yazıda özetlerin hemen altında Türkçe ve İngilizce 3-10 kelime arasında anahtar kelime verilmeli, anahtar kelimeler index Medicus'un konu başlıklarına uygun olmalıdır.

**Şekil ve Fotoğraflar:** Siyah-beyaz ve parlak kağıda basılmış olmalı ve ayrı bir zarf içinde herhangi bir kağıda yapıştırılmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile aydınlatılmış kağıda veya beyaz kağıda çizilmeli, ya da bilgisayarda yapılmalıdır. Şekil ve fotoğraflar da üç nüsha şeklinde gönderilmelidir. Her şeklin arkasına şeklin yönü, numarası ve ilk yazarın ismi kurşun kalemle yazılmalıdır. Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda, şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.

**Tablolar:** Ayrı bir kağıda çift aralıklı olarak yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullanılmamalıdır. Her tablonun üzerine numara (romen rakamı ile) ve başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka kullanılmalıdır.

**Kaynaklar:** Kaynakların yazılışı Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Yazar isimleri altı geçiyorsa, ilk üç isim yazılmalı ve sonunda Türkçe kaynaklarda "ark." yabancı dildeki kaynaklarda "et al" sözcükleri eklenmelidir. Gerekirse ana kurallar [www.icjme.org](http://www.icjme.org) adlı siteden öğrenilebilir.

**Örnek:** Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. *N Engl J Med.* 2002;347:284-7.

**Örnek:** Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). *BMJ* 1981;283:628. Kaynak kitap ise aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

### **Kitap yazımları**

**Örnek (Genel kitap):** Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. *Medical microbiology.* 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. *Operative obstetrics.* 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.

**Örnek (Kitap içinde bölüm):** Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. *The genetic basis of human cancer.* New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

**Kısaltmalar:** Başlık ve özetinde kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kısaltma ilk kez kullanıldığında önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü açık olarak yazılmış bulunmalıdır.

**Yazışma Adresi:** Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22, Küçükyaşı 34854 İSTANBUL

Tel: 0216 388 32 75 Faks: 0216 417 10 06 e-mail: [frik@frik.com.tr](mailto:frik@frik.com.tr) [www.frik.com.tr](http://www.frik.com.tr)

# dicetel®

Pinaverium Bromid 50 mg



## İnsanı Bıktıran Sorunlar

### dicetel® 40 Film Tablet

**Formülü:** 1 film tablet; **Aktif Madde:** 50 mg Pinaverium Bromid. **Farmakolojik Özellikleri:** Dicetel (aktif madde olan Pinaverium Bromid) gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki yapan antispazmodik ve müskülotropik maddedir. Kalsiyum antagonisti özellikleri vardır. Mide sekresyonunun hacmini değiştirmeden asit debili azaltır. Mide boşalmasını çabuklaştırır. Dicetel'de antikolinerjik tipte yan etkiler yoktur; bu nedenle glokomu ve prostatlı hastalarda da kullanılır.

**Endikasyonları:** İrritabl barsak sendromu semptomlarında, karın ağrısı, spazm ve fonksiyonel gastrointestinal şikayetlerde, barsak rahatsızlıklarının ve düzensizliklerinin semptomatik tedavisinde endikedir. **Hamileler, Emziciler ve Çocuklarda Kullanımı:** Hayvanlar üzerinde Pinaverium Bromid ile yapılan teratojenite çalışmalarında herhangi bir fetal anormallik gözlenmemesine rağmen, Dicetel emniyet açısından hamile kadınlara verilmemelidir. İlacın insan sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. Etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmadığından çocuklarda kullanılmamalıdır. **Yan Etkiler / Advers Etkileri:** Dicetel'in istenmeyen etkileri nadirdir. Gastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve konstipasyon, çok nadir minör sindirim rahatsızlıkları olabilir. Pek çok vakada, bunların Dicetel ile bir bağlantısı olmadığı bildirilmiştir, çünkü bu semptomlar hastalıkla bağlantılıdır. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Genellikle günlük doz 3 tablettir. Yemek esnasında günde 3 defa 1'er tablet çiğnenmeden su ile yutulur. Doz doktor tavsiyesi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir. **Ticari Takdim Şekli ve Ambalajı:** 40 film tablet blister ambalajda. %8 KDV dahil P.S.F. 10,39 YTL (Eylül 2006). **Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi:** DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınevler mah. Sanayi cad. 22 34854 Küçükyalı-İSTANBUL. **Ruhsat Tarih ve No:** 23.06.1993-164/85. Reçete ile satılır.



# Kreval Şurup

Butamirat sitrat

Kayısı Aromalı



Eğlenmeye devam...

Çünkü  
Öksürük kontrol  
altında...

**Kreval Şurup 100 ml;**

**FORMÜLÜ:** 5 mL Kreval Şurup 7.5 mg Butamirat Sitrat ve yardımcı madde olarak sodyum sakarin, sorbitol, benzoik asid ve kayısı aroması içerir. **Farmakodinamik**

**Özellikleri:** Butamirat Sitrat kimyasal olarak Opium alkaloidlerinden farklı yapıda ve farklı farmakolojik özellikte santral etkili bir antitüsif (öksürük kesici) ajandır. Antitüsif ilaçlar öksürük refleksi öksürük merkezinin inhibisyonu ile, spazmolitik etkiye bağlı akciğerlerdeki öksürük reseptörlerinin duyarlılığını azaltarak veya periferel afferent sinir uçlarının inhibisyonu ile baskırlar. Butamirat sitrat antitüsif etkisini beyin sapındaki öksürük merkezini inhibe ederek ve bronkospazmolitik aktivitesi ile gösterir. Geniş bir terapötik indekse sahip olan butamirat sitrat spirometrik ve kan gazı değerlerini tedavinin başlangıcından kısa süre sonra düzeltir. **ENDİKASYONLARI:** Değişik nedenlere bağlı akut öksürük durumları. Cerrahi girişim ya da bronkoskopi öncesi ve sonrasında gelişen öksürük durumları. **UYARILAR / ÖNLEMLER:** Gebelik döneminde kullanımı ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte ilk 3 ay süresince bu ilacın kullanılmaması önerilmektedir. Butamirat sitratın anine sütmüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir (Gebelik kategorisi: C). Butamirat sitrat ile hiçbir ilacın etkileşimde bulunduğuna ilişkin kanıt yoktur. **KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:** Doktora danışmadan kullanılmamalıdır! Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise; 3-6 yaş arasındaki çocuklarda günde 3 defa 1 ölçek (1 ölçek = 5 ml) 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2 ölçek 12 yaşından büyük çocuklarda günde 3 defa 3 ölçek Yetişkinlerde günde 4 defa 3 ölçek. **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:** Kreval Şurup; 1,5 mg/mL, 100 mL'lik renkli şişede, 5 mL'lik 1, 2,5 ve 5 mL'ye işaretli kaşık ölçekle beraber, %8 KDV dahil P.S.F. 6,30 YTL (Eylül 2006). **RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ:** DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınevler mah. Sanayi cad. 22 34854 Küçükyalı / İSTANBUL **RUHSAT TARİHİ VE NO:** 13.09.2004 – 204/63 Reçete ile satılır.



www.frik.com.tr