

ISSN 0378-8628

Ekim-Kasım-Aralık 2009

Dirim

Yıl: 84

Üç ayda bir yayımlanır



Tarihte bilinen ilk hastane
(Asklepion, Bergama)

Tıp Gazetesi

Kreval

Şurup

Butamirat sitrat

Kayısı Aromalı



Eğlenmeye devam...

Çünkü

Öksürük kontrol altında...



Kreval Şurup 100 ml

FORMÜLÜ: 5 mL Kreval Şurup 7.5 mg Butamirat Sitrat ve yardımcı madde olarak sodyum sakarin, sorbitol, benzoik asit ve kayısı aroması içerir. **Farmakodinamik**

Özellikleri: Butamirat Sitrat kimyasal olarak Opium alkaloidlerinden farklı yapıda ve farklı farmakolojik özellikle santral etkili bir antitüsif (öksürük kesici) ajandır.

Antitüsif ilaçlar öksürük refleksini öksürük merkezini inhibisyonu ile, spazmolitik etkiye bağlı akciğerlerdeki öksürük reseptörlerinin duyarlılığını azaltarak veya

periferal afferent sinir uçlarının inhibisyonu ile baskırlar. Butamirat sitrat antitüsif etkisini beyin sapındaki öksürük merkezini inhibe ederek ve bronkospazmolitik aktivitesi ile gösterir. Geniş bir terapötik

indekse sahip olan butamirat sitrat spirometrik ve kan gazı değerlerini tedavinin başlangıcından kısa süre sonra düzeltir. **ENDİKASYONLARI:** Değişik nedenlere bağlı akut öksürük durumları, Cerrahi girişim

ya da bronkoskopi öncesi ve sonrasında gelişen öksürük durumları. **UYARILAR / ÖNLEMLER:** Gebelik döneminde kullanımı ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte ilk 3 ay süresince bu ilacın

kullanılmaması önerilmektedir. Butamirat sitratın anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir (Gebelik kategorisi: C). Butamirat sitrat ile hiçbir

ilacın etkileşiminde bulunduğuına ilişkin kanıt yoktur. **KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU:** Doktora danışmadan kullanılmamalıdır! Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise: 3-6 yaş arasındaki çocuklarda

günde 3 defa 1 ölçek (1 ölçek = 5 ml) 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2 ölçek 12 yaşından büyük çocuklarda günde 3 defa 3 ölçek Yetişkinlerde günde 4 defa 3 ölçek. **TİCARİ TAKDİM**

ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kreval Şurup; 1.5 mg/mL, 100 mL'lik renkli şişede, 5 mL'lik 1, 2.5 ve 5 mL'ye iştirtili kaşık ölçekle beraber. 968 KDV dahil P.S.F. 6.62 TL. (Aralık 2009) **RUHSAT**

SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınevler mah. Sanayi cad. 22 34854 Küçükyalı / İSTANBUL **RUHSAT TARİHİ VE NO:** 13.09.2004 – 204/63 Reçete ile satılır.



www.frik.com.tr

Üç ayda bir yayımlanır

Genel Müdürlük : Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 42,

34854 Küçükyalı - İSTANBUL

Tel: +90 216 388 32 75

Faks: +90 216 417 10 06

Adana Bölge: Güzelyalı Mah. 28. Sok. Server Apt. No:1 K:2 D:6

Seyhan - ADANA

Tel: +90 322 234 65 25

Faks: +90 322 232 37 13

Ankara Bölge: Mıtlukent Mah. 5. Cad. No: 28

Umitköy - ANKARA

Tel: +90 312 236 18 50

Faks: +90 312 236 28 65

Antalya Bölge: Güzeloba Mah. Barınaklar Bulvarı Doktorlar sitesi

E Blok No: 182 ANTALYA

Tel: +90 242 349 15 34

Faks: +90 242 349 15 35

Bursa Bölge: Çamlıca Mah. Akarsu Sok. 3. Platin Sitesi J Blok No:12/7

Niüfer - BURSA

Tel: +90 224 453 25 81

Faks: +90 224 453 25 82

Dişyarbakır Bölge: Kayapınar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. Suvar 1 Apt

D:1 DİYARBAKIR

Tel: +90 412 252 11 65

Faks: +90 412 252 11 64

İstanbul Bölge: Ali Rıza Gürçan Cad. Alpaslan İş Merkezi No:30

K.6/23 Merter - İSTANBUL

Tel: +90 212 483 43 98-99

Faks: +90 212 483 43 97

İzmir Bölge: Kemal Paşa Cad. No:26 Selçuk Ecza Deposu Binası Kat:

3 İşıkkent - İZMİR

Tel: +90 232 472 04 80

Faks: +90 232 472 08 64

Konya Bölge: Yunus Emre Mah. Badi Sabah Sok. No:3/1 Meram -

KONYA

Tel: +90 332 323 06 01

Faks: +90 332 323 06 02

Marmara Bölge: Atatürk Mah. Dudullu Yolu Cad. Kerembey Sok. No:

1/2 Özdemir Plaza Dudullu - İSTANBUL

Tel: +90 216 456 17 85

Faks: +90 216 456 68 25

Samsun Bölge: Yeni Mah. İnönü Bulvarı No:78 Atakent - SAMSUN

Tel: +90 362 439 29 51

Faks: +90 362 439 29 52

Trabzon/Erzurum Bölge: 2 No'lu Beşirli Mah. Devlet Sahilyolu Cad.

Turankardeşler Apt. No: 485 Kat:2/3 TRABZON

Tel: +90 462 223 03 46

Faks: +90 462 223 03 47

Yurtdışı:

Azerbaycan: Teymur Aliyev Küçesi 65 1069 BAKU - AZERBAIJAN

Tel: +99 412 561 40 32

Faks: +99 412 561 40 34

Gürcistan: Pudapesh Cad. No:7 Kat:1 Saburtala Tisliş - GÜRCİSTAN

Tel: +0099 583 238 10 54

Faks: +0099 583 238 10 54

Baskı Ön Hazırlık Grafik Tasarım ve Uygulama:



www.turkiyeklinikleri.com

Türkiye Klinikleri

Grafik Tasarım

Fatma Özgür OFLAZ

Kültür-Sanat

Dr. Serra Menekay ÖNCEL

İletişim

Türkocağı Caddesi No: 30

Balgat / ANKARA

Tel: 0 (312) 286 56 56 (pbx)

Faks: 0 (312) 220 04 20

E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

Baskı

Ali Rıza Başkan, Güzel Sanatlar Matbaası A. Ş.

Kıraç, Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu 46. Sokak No:4

Esenyurt - Büyükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE

Baskı Tarihi

Ocak 2010

Kurucusu

Dr. Feridun FRİK

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Erol FRİK

Genel Koordinatör

Dr. Burcu ATAMAN

Yayın Koordinatörü

Özge ALTAY

Ağca AŞICIOĞLU

Reklam ve Halkla İlişkiler

Derya TELCİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Erhan ABAY

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Cüneyt AYTEKİN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin ERGEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan GÖÇMEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüsvur HATEMİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Fazilet KARAKOÇ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cem KOPUZ

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Halil KOYUNCU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur ÖZÇELİK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Oğuz POYANLI

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Ortopedi Kliniği

Dr. Ülkümen RODOPLU

Dr. Nevval Salih İsgören Devlet Hastanesi,

Aile Hekimliği Bölümü

Doç. Dr. Haldun SOYGÜR

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat TUNCER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tel: 0216 388 32 75

E-mail: frik@frik.com.tr

Mictonorm®

Propiverin Hidroklorür

idrar kaçırma
tedavisinde yeni bir **norm**



Formülü: Her draje, Etken madde: 15 mg propiverin hidroklorür içerir. **Farmakodinamik Özellikler:** Kalsiyumun içeri alımının inhibisyonu ve muskulotropik spazmolizise neden olan mesane düz kas hücreleri arası kalsiyumun düzenlenmesi ve antikolinergik etkiye bağlı olarak pelvik sinirin efferent bağlantısının inhibisyonudur. **Endikasyonlar:** Gerek idiyopatik detrusör aşırı aktivitesine bağlı, gerekse omurluk yaralanmalarına bağlı nörojenik detrusör aşırı aktivitesi, örneğin transvers lezyon parapleji olan hastalarda ani idrar sıkışması ve sık idrara çıkma gibi, idrar tutamama problemlerinin tedavisinde endikedir. **Kontraindikasyonlar:** İlaç, aktif maddeye ya da herhangi bir yardımcı maddeye aşırı hassasiyet gösteren hastalarda, bağırsak obstrüksiyonu, üriner retansiyonun beklenildiği önemli dereceli mesane taşıma obstrüksiyonu, miyasteni gravis, intestinal atoni, ciddi ülseratif kolit, toksik megakolon, kontrol edilememiş kapalı açılı glökom, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer yetmezliği, taşıarlımlı Uyanlar/Önlemler: Otonomik nöropati şikâyeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır: Aşağıdaki hastalıklardan semptomları, ilaç alımını takiben şiddetlenebilir: ciddi konjestif kalp yetmezliği, prostatik hipertrofi, reflü özofajit ile hiatus hernisi, kardiyak aritmi, taşikardi. Diğer antikolinergikler gibi, propiverin, midriyazis'e neden olur. Bundan dolayı, anterior odanın ön açılan ile yatınlık kazanmış bireylerde akut kapalı açılı glökoma neden olma riski artabilir. Organik mesane hastalıklarına bağlı olduğu kadar, böbrek hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı pollaküri ve noktüriye tedaviden önce hüküm verilmelidir. Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanım: Gebelik Kategorisi: C Propiverin hidroklorürü hamilelik sırasında kullanılmamalıdır ve emziren kadınlara verilmemelidir. Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkileri: Hastanın bir motorlu taşıt ya da başka bir makine kullanmak gibi zihinsel uyanıklık gerektiren aktiviteleri yapma kabiliyetini ya da bu ilaç kullanırken tehlikeli olabilecek iş yapma kabiliyetini azaltabilir. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Ağız kuruluğu, anormal akomodasyon, kabızlık, yorgunluk, akomodasyon, bulantı/kusma, baş dönmesi, titreme, idrar retansiyonu, kızarma, uyusuklulukla beraber düşük kan basıncı, aşırı duyarlılığa ya da hipersensitiviteye bağlı lekelenme, çarpıntı, huzursuzluk, konfüzyon. Tüm istenmeyen etkiler geçicidir ve bir doz indirimi ile ya da terapinin sonlandırılmasından maksimum 1-4 gün sonra yok olur. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler: Trisiklik antidepressanlar, antikolinergikler, antantadin, nöroleptikler ve beta-adrenoseptör agonistler ile birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri artar. Kolinergik ilaçlarla birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri azalır. İzoniazid ile tedavi edilen hastalarda kan basıncını düşürür. Metoklopramid gibi prokinetiklerin etkisi azalabilir. Sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) tarafından metabolize edilen diğer ilaçlar ile farmakokinetik etkileşimler olabilir. Propiverin, zayıf bir sitokrom P450 3A4 inhibitörü olarak düşünülebilir. Kullanım şekli ve dozu: Günde iki defa bir standart draje dozu tavsiye edilmektedir, bu doz günde üç defaya kadar çıkartılabilir. Doz Aşımı: Aşırı dozun tedavisi, yetişkinlerde 1.0 ila 2.0 mg yavaş intravenöz enjeksiyon (eğer gerekirse toplam 5 mg'a kadar tekrar edilebilir) dozu ile atropin aşırı doz alımının tedavisinde olduğu gibi, kusmanın ya da gastrik lavajın başlatılmasını takiben semptomatik ve destekleyici tedaviyi içerebilir. Saklama Koşulları: 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ticari Takdim Şekli, Ambalaj Muhtevası ve Fiyatı: Mictonorm 15 mg 56 draje, blister ambalajlarda. KDV Dahil P.S.F: 67,00 YTL. (Ekim 2006). Ruhsat Sahibi: DR. F. FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Aydınlevler Mah. Sanayi Cad. 22 34854 Kütükyalı-İSTANBUL Ruhsat Tarihi ve Numarası: 04.04.2006 119/77 İmal Yeri: APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya Reçete ile satılır.



Merhaba Sevgili Okurlar;

Kış mevsiminin gelişiyile birlikte doğa bir sonraki uyanışına dek dinlenmeye çekildi. Kısalan günler, soğuyan hava ve hızlanan yağışlar ile kış her yerde kendini hissettiriyor. Kar ve kayak tutkunları için ise sezon heyecanı başladı. Dört mevsimi yaşayabilen güzel ülkemiz, bize her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu hatırlamamızı sağlayan olanakları tüm cömertliği ile sunuyor.

Bizler değişen bir diğer mevsimde yeni bir "Dirim"le yanınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda da bilimsel makaleler sizlerin katkı ve ilgisiyle hazırlanıp sunuldu. Araştırma, derleme ve olgu sunumlarının yanı sıra, geçen sayılarda yayımlamaya başlamış olduğumuz yazı dizisinin dördüncü ve son bölümü de bu sayıdaki yerini aldı. Dergimizde yayımlanmak üzere bilimsel makalelerini gönderen siz değerli hekimlerimizin yoğun ilgi ve katkısına çok teşekkür ederiz. Türkiye Klinikleri Yayınevinin bu konudaki destek ve yardımlarıyla Dirim dergisi her geçen sayıda daha da güçlenip güzelleşmekte. Bu bölümün hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Dergimizin bu sayısında, Kültür Sanat köşemizin "Tarih" bölümünde Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz hep birlikte. Yirminci yüzyılın en önemli arkeolojik buluntusu ve kimilerine göre dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılan "Terra Cotta Savaşçıları ve Müzesi" Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xi'An şehrinde yer alıyor. Bu gerçekten ilginç müzeyi ve öyküsünü yerinde izleyip, çektiği fotoğraflar ve güzel Türkçesiyle bize aktaran Dr. Serra Menekay'a çok teşekkür ediyoruz. Röportaj bölümümüzün konuğu ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gülbahar. Kendisi yoğun iş temposunun stresini fotoğraf çekerek hafifletmeyi başaran ve ilk sergisini yakınlarda açmış olan bir fotoğraf sanatçısı. Bizlere zaman ayırarak fotoğrafçılık geçmişini ve birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kitap köşemizde Prof. Dr. Türkan Saylan'ı anlatan Ayşe Kulin'in "Türkan" isimli eserine yer verdik. Kültür ve sanatın önemli başlıklarından biri olan "El sanatları" köşemizin konusu ise tahta ve ağaç işçiliği.

Dergimizin bu sayısını sizlere ulaştırırken ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyor ve hepimize sağlık dolu mutlu günler diliyoruz.

Dr. F. Frik İlaç

DİRİM DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda aşağıdaki kurallar aranır:

1- Başlık sayfasında makale başlığı, İngilizce başlık, kısa başlık, yazar adları, çalıştığı kurumlara ait birimler, yazışma işini üstlenen yazarın açık adresi, telefon numaraları (sabit ve cep), elektronik posta adresi belirtilmelidir:

a) Yazının başlığı kısa olmalı ve büyük harfle yazılmalıdır.

b) Sayfa başlarına konan kısa başlık 40 karakteri geçmemelidir.

c) Akademik unvan kullanılmadan meslek unvanı belirtilebilir.

d) Makale birden fazla yazar tarafından yazılmış ise, aynı ünitelerde çalışan yazarların soyadları sonuna aynı miktarda yıldız konur.

e) Çalışma bilimsel bir kuruluş ve/veya fon ile desteklenmişse dipnot olarak belirtilmelidir.

f) Makale, kongre/sempozyumda sunulmuşsa mutlaka sunum türü ile birlikte belirtilmelidir.

2-Yazılardaki terimler mümkün olduğunca Türkçe ve Latince olmalı, dilimize yerleşmiş kelimelere yer verilmeli ve Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğü kullanılmalıdır. Öz Türkçe'ye özen gösterilmeli ve Türkçe kaynak kullanımına önem verilmelidir.

3- Metin içinde geçen Latince mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orijinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: *Pseudomonas aeruginosa*, *P. aeruginosa* gibi. Yazıda sadece cins adı geçen cümlelerde stafilokok, streptokok gibi dilimize yerleşmiş cins adları Türkçe olarak yazılabilir. Antibiyotik isimleri dil bütünlüğü açısından okunduğu gibi yazılmalıdır. Antibiyotik isimleri uluslararası standartlara uygun olarak kısaltılmalıdır.

4- Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "miş'li geçmiş" zaman edilgen kip ile yazılmalıdır.

5- A4 kağıtların yalnız bir yüzü kullanılmalı, kenarlardan 3'er cm boşluk bırakılmalıdır. 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı, 2 satır aralığı (double space) bulunmalıdır.

6- Metinlerin tamamı 3,5" diskete veya CD'ye kopyalanmış olarak ve basılmış üç nüsha ile bir

zarf içinde gönderilmelidir. İliştirilen bir üst yazıda metnin tüm yazarlarca okunduğu ve onaylandığı, yazıların yayına kabul edilmesi halinde telif hakkının dergiye devredileceği belirtilmelidir.

7- Yayımlanmış gereçleri yeniden basmak veya deney konusu olan insanların fotoğraflarını kullanmak için alınan izinler, insanlar üzerinde ilaç kullanarak yapılan klinik araştırmalarda ilgili "Kurum Etik Kurul Onayı" ve gönüllülerden yazılı bilgilendirme ile olur alındığına dair belgeler birlikte gönderilmelidir.

8- Makale yazımında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

a) Araştırma yazıları; Türkçe Özet, İngilizce Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümler, sola yaslanacak şekilde büyük harflerle kalın yazılmalıdır. İngilizce makalelerde Türkçe Başlık ve Özet bulunmalıdır.

Türkçe Özet: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma alt başlıklarından oluşmalıdır (yapılandırılmış özet) ve en az 100, en fazla 250 sözcük içermelidir.

İngilizce Özet (Summary): Başlığı İngilizce olmalıdır. Türkçe Özet bölümünde belirtilenleri birebir karşılayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Türkçe ve İngilizce Özetlerin altında verilmelidir. Anahtar kelime sayısı 3-8 arasında olmalı ve Index Medicus Medical Subject Headings'de (MeSH) yer alan sözcükler kullanılmalıdır.

Giriş: Araştırmanın amacı, benzer çalışmalarla ilgili literatür bilgisi kısaca sunulmalı ve iki sayfayı aşmamalıdır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın gerçekleştirildiği kuruluş ve tarih belirtilmeli, araştırmada kullanılan araç, gereç ve yöntem açıkça sunulmalıdır.

Bulgular: Sadece elde edilen bulgular açık bir şekilde belirtilmelidir.

Tartışma: Bu bölümde, araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, diğer araştırmacıların bulgularıyla karşılaştırılmalıdır. Araştırmacı, kendi yorumlarını bu bölümde aktarmalıdır.

Teşekkür Bölümü: Gerekli görülyorsa Kaynaklar bölümünden hemen önce belirtilmelidir.

Kaynaklar: Metnin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Numaralar, parantez içinde cümle sonlarında verilmelidir. Kaynakların yazılımı mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

Kaynak bir dergi ise: Yazar(lar)ın Soyadı Adının baş harf(ler)i (altı veya daha az yazar varsa hepsi yazılmalıdır; yazar sayısı yedi veya daha çoksa yalnız ilk üçünü yazıp et al. "ve arkadaşları" eklenmelidir) Makalenin başlığı, Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi, Yıl; Cilt (Sayı): İlk ve son sayfa numaraları.

Standart Dergi makalesi için örnek: Demirci M., Ünlü M., Şahin Ü. A Case of Hydatid Lung Cyst Diagnosed by Kinyoun Staining of Bronco-Alveolar Fluid. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2001; 25 (3): 234-5.

Yazarı verilmemiş makale için örnek: Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br. Med J 1981; 283: 628.

Dergi eki için örnek: Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional asplenia: demonstration of splenic activity by bone marrow scan (Summary). Blood 1979; 54(Suppl 1): 26a.

Kaynak bir kitap ise: Yazar(lar)ın Soyadı Adının baş harf(ler)i. Kitabın Adı. Kaçınıcı basım olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Basım yılı.

Örnek: Eisen HN. Immunology: an Introduction to Molecular and Cellular Principles of the Immune Response. 5th ed. New York: Harper and Row, 1974: 406.

Kaynak kitabın bir bölümü ise: Bölüm yazar(-lar) ın Soyadı Adının başharf(ler)i. Bölüm başlığı. In: Editör(ler)in Soyadı Adının başharf(ler)i ed/ eds. Kitabın Adı. Kaçınıcı baskı olduğu.

Basım yeri: Yayınevi

Basım yılı: Bölümün ilk ve son sayfa numaraları.

Örnek: Weinstein L. Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic Physiology: Mechanism of Disease. Philadelphia. WB Saunders, 1974: 457-72.

Kaynak bir web adresi ise: Web adresi, bilgiye ulaşılan tarih belirtilmelidir.

Şekil ve Tablolar: Her tablo (şekil, grafik, fotoğraf) ayrı bir sayfaya basılmalı, alt ve üst çizgiler ve gerektiğinde ara sütun çizgileri içermelidir. Tablolar, "Tablo 1." şeklinde numaralandırılmalı ve tablo başlığı tablo üst çizgisinin üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı bilgiye başlıkta değil dipnotta yer verilmeli, uygun simgeler (*, +, ++, vb.) kullanılmalıdır. Fotoğraflar "jpeg" formatında olmalıdır. Baskı kalitesinin artırılması için gerekli olduğu durumlarda fotoğrafların orijinal halleri talep edilebilir. Maksimum 127x173 mm ebadında, kaliteli, parlak kağıda basılmış olan fotoğrafların arkasına makale başlığı ve şekil numarası yazılıp ayrı bir zarf içinde yazıya eklenmelidir.

b) Derleme türü yazılarda yazar sayısı ikiden fazla olmamalı ve yazar daha önce bu konuda çalışma ve yayın yapmış olmalıdır. Derlemelerde İngilizce özet, İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler bulunmalıdır.

c) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlık ve özet, anahtar sözcükler yer almalı, giriş, olgu ve tartışma bölümleri bulunmalıdır. Olgu sunumlarında metin yedi sayfayı, kaynak sayısı yirmiyi aşmamalıdır.

d) Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından "Editöre Mektup" bölümünde yayımlanır. Bu yazıların bir sayfayı aşmaması ve en fazla beş kaynakla desteklenmesi gerekmektedir.

9- Bu kurallara uygun olmayan metinler kabul edilmez.

10- Yazarlar teslim ettikleri yazının bir kopyasını saklamalıdır.

11- Yazılar aşağıdaki adrese gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.

Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 42 34854 Küçükalyalı / İSTANBUL

Tel: 0216 388 32 75

E-mail: frik@frik.com.tr

Rivaxel®

Rivastigmin

**Paylaşılan anılar
hiç kaybolmasın...**



RIVAXEL® KAPSÜL FORMÜLÜ: Bir kapsül 1.5mg-3mg-4.5 mg-6mg rivastigmin (hidrojen tartarar şeklinde) içerir. **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:** Farmakodinamik Özellikler: Karbamat tipi bir beyin-selektif asetilkolinesteraz inhibitörü olan rivastigminin, fonksiyonel bakımdan sağlam kolinerjik nöronlardan serbest kalan asetilkolinin parçalanmasını yavaşlatarak, kolinerjik sinir iletimini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Ayrıca kolinerjik inhibisyonun, amiloidjen b-amiloid-prekürsör protein (APP) fragmanlarının ve dolayısıyla da Alzheimer hastalığının başlıca patolojik özelliklerinden biri olan amiloid plakların oluşumunu yavaşlatılabildiğini gösteren bazı kanıtlar vardır. **Farmakokinetik Özellikler:** Emilim: Rivastigmin hızla ve tamamen emilir. Maksimal plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 1 saat içerisinde ulaşılır. **ENDİKASYONLAR:** Alzheimer veya Parkinson hastalığına eşlik eden hafif-orta derecedeki demansın semptomatik tedavisinde endikedir. **KONTRENDİKASYONLAR:** RIVAXEL diğer karbamat türevlerine veya formülasyonun diğer bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. **UYARILAR / ÖNEMLER:** Bulantı, kusma ve anoreksi gibi gastrointestinal sorunlar, özellikle tedavide başlandığında ve/veya doz yükseltildiğinde görülebilir. Bu advers etkilere kadın hastalarda ve tırasyonlarında daha çok rastlanmaktadır. Alzheimer hastaları kilo kaydedebilir. Rivastigmin dahil kolinerjik inhibitörlerine bu hastalarda kilo kaybı eşlik etmiştir. Hastanın kilosu, tedavi sırasında takip edilmelidir. Gebelik ve emziren annelerde kullanım: Gebelik kategorisi: B RIVAXEL'in gebe kadınlarda ilaç emniyeti saptanmış değildir ve gebe kadınlarda bu ilaç ancak beklenen faydaları, fetusun görüleceği zararlarından fazla olduğu takdirde kullanılmalıdır. Emzirme: RIVAXEL'in insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle RIVAXEL uygulaması sırasında emzirme tavsiye edilmez. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri: Alzheimer hastaları araç kullanma performansını yavaş yavaş bozabilir veya makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Buna ilaveten rivastigmin daha çok tedavide başlandığında veya doz yükseltildiğinde görülmek üzere göz karamasına ve somnolansa neden olabilir. RIVAXEL ile tedavi edilen hastalarda herhangi bir hareket forksiyonu bozukluğu görülmemiştir. Ancak Alzheimer hastalarının araç veya kamaşık makinelere kullanmaya devam etme konusundaki yetenekleri, kendilerini tedavi eden doktor tarafından rutin olarak değerlendirilmelidir. **YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:** Genel bozukluklar: Yorgunluk, güçsüzlük, grip benzeri belirtiler, kilo kaybı. Gastrointestinal sistem bozuklukları: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, iştah kaybı, hazımsızlık, kabızlık, mide ve duodenum ülseri, gastrointestinal kanama, pankreatit **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** Rivastigmin, başlıca esterazlar tarafından hidroliz yoluyla metabolize edilir. Sitokrom P450 izoenzimleri tarafından minimal bir metabolizma söz konusu olduğundan rivastigminin, bu enzimlerin metabolize ettiği diğer ilaçlarla herhangi bir farmakokinetik etkileşim göstermesi beklenmez. **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** RIVAXEL, doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sabah ve akşamları yemek ile birlikte olmak üzere günde 2 defa alınmalıdır. Önerilen başlangıç dozu, günde 2 defa 1.5mg'dır. Bu doz, en az 2 hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse günde 2 defa 3mg yükseltilebilir. Dozun daha sonra günde 2 defa 4.5 ve 6 mg yükseltilmesi, her bir dozda minimum 2 haftalık tedavi sonrasında ve hastanın o dozu iyi tolere etmesinden sonra düşünülmemelidir. **İdame dozu:** Günde 2 defa 1.5-6mg; maksimal terapötik yarar sağlanabilmesi için hastaların, tolere ettikleri en yüksek dozu idame dozu olarak kullanmaları gerekir. Önerilen maksimal günlük doz: Günde 2 defa 6mg. **DOZ AŞIMI:** Semptomlar: Kazanılan oluşturan hemen bütün doz aşımı vakalarına hiçbir klinik belirti ya da semptom eşlik etmemiş ve hastalar, RIVAXEL kullanmaya devam etmişler. Çok yüksek doz aşımı durumunda atropin kullanılabilir. Bunun için başlangıçta önerilen atropin sülfat dozu, intravenöz olarak 0.03 mg/kg'dır. **SAKLAMA KOŞULLARI:** 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE FİYATI:** RIVAXEL 1.5mg Kapsül, 28 kapsüllük blister ambalajlarda 66.86 TL (Temmuz 2009), RIVAXEL 3mg Kapsül, 28 kapsüllük blister ambalajlarda 66.86 TL (Temmuz 2009), RIVAXEL 4.5mg Kapsül, 28 kapsüllük blister ambalajlarda 66.86 TL (Temmuz 2009), RIVAXEL 6mg Kapsül, 28 kapsüllük blister ambalajlarda 66.86 TL (Temmuz 2009), RUHSAT NUMARASI RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ DR.FRİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜRETİCİ YENİ İLAÇ VE HAMMADELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.



C B R L

Certainly

Brings

Re

Laxation

Kesinlikle rahatlatır!

cabral®

Feniramidol HCl

Bel, boyun, sırt ve yumuşak doku hastalıklarından kaynaklanan miyaljilerde tek etken madde ile miyorelaksan ve analjezik etki

* Prospektüs Bilgisi

Cabral® drage / ampul / Formül: 3 ml - 1 ampul. Etkin madde: 800 mg Feniramidol HCl 1 drage, Etkin madde: 400 mg Feniramidol HCl Farmakolojik Özellikleri Cabral, beyin ve medulla spinaliste polisinaptik refleksleri bloke etmek suretiyle, ağrı kasılma zincirini yıklar. Bu suretle ağrı eylemlerini giderir, adale ağrılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Morosinaptik refleksleri etkilemez. Miyorelaksan ve analjezik olarak Cabral, çizgili adale ve hareket sisteminin diğer yapılarında akut ve kronik ağrıların tedavisinde etkilidir. Endokanjonlar Bel ağrılar, lumbago, sırtık, disk rahatsızlıkları ve medika-mekanik veya sinaptik, mesela so altı masajları gibi diğer tedavileri destekleyici olarak kullanılır. Adalelerdeki gerginlikleri giderir, ağrıyı geçirir ve krampti halindeki illaleti odulandırır. Kasılmayı önler. Preparatın bilineninde yerlerini koruyucu bir meddyere kısa hassasiyetli olarak kullanılmaktadır. Uyuzlar / Çukurluk Cabral drage, Amalgamlarına birlikte alındığında karame, oral antidiyabetiklerle karboluolar materyallerinde deyişlik, onkolojideki gaz tıremesi güme basıllıkları, karacine alınmayan korakuler ortaya çıkama Cabral'ın kesilmesi ve doktoru gidilmesi tavsiye olunur. İlaçlarda boyay madde olarak kullanılan Tartrazine ilimlerin alında okküdyü kalde hassasiyet reaksiyonu giptirme potansiyeli bulunduğundan dikkatle kullanılması tavsiye edilir. Cabral ampul, adale zerklerinde iyi tahammül edilir. Nadir olarak zerkten sonra bas dönmeye sersemlik olabilir. Bu sebeple zerklerden sonra 1 saat istirahat tavsiye edilir. Başka tedaviye gerek yoktur. Yan Etkiler / Advers Etkiler: Nadiren alerjik reaksiyonlar görülür. Cabral ampul, adale zerklerinde iyi tahammül edilir. Nadir olarak zerkten sonra bas dönmeye sersemlik olabilir. Bu sebeple zerklerden sonra 1 saat istirahat tavsiye edilir. Başka tedaviye gerek yoktur. Yan Etkiler / Advers Etkiler: Nadiren alerjik reaksiyonlar görülür. Bazı hassas hastalarda mide de dalğululuk veya bulantı, dilde yanma duyusu veya deri kızamığı yapabilir. Fakat cabuk geçicidir, sıvazlık, kızamık ve deri döküntüleri görülebilir. Eğer hiperemsi veya deri döküntüleri olursa ilaç verilmesi durdurulur. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler Cabral drage, kumun damarları (ortokojenler) bulubunad, oral antidiyabetik ve diüretiklerle ille tedav (görm hastalarında, bu ilaçların etkilerinin artması)ndan dikkatle kullanılmaktadır. Kullunm Sıklığı ve Dose: Cabral drage, Gözde 3 kez 1 2 drage, yemelerden sonra alınmalıdır. Cabral ampul, Günlük 1 ampul günde 3-4 kez alınarak 3000 mg'a kadar iyileşme edilebilir. Ancak ilaaz bağlı herhangi bir semptom görülür ise doktorunu danışmalıdır. Tıcan Toksik Sıklığı ve Amalgam 24 drage'lik blister ambalajlarda, KDV Dahil P.S.F. 7,21 - YTL (Kasım 2007). Her bir kutuda, 3 ml'lik 3 ampul, KDV Dahil P.S.F. 3,46 - YTL (Kasım 2007). Sıklama Kusurlar: 25C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. İSTANBUL. İmal Yeri: Cabral drage, Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. Tic. A.Ş. Eseyurtu/İstanbul. Cabral ampul, Mefar İlaç San. A.Ş. Kartal-İSTANBUL. Ruhsat Tarihi ve No: Cabral drage, 11.11.1970 - 106/12. Cabral ampul, 11.11.1970 - 106/14. Reçete ile satılır.



www.frik.com.tr

İÇİNDEKİLER

Araştırma

- Sertralinin P Dalga Dispersiyonuna Etkisi 111-114
MEHMET DEMİR
- Kısa Süreli Motor Aktivitenin El Beceri Hızı Üzerine Etkisi 115-124
NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN, AYŞE CANAN YAZICI, İLKNUR ÖZMEN,
BELKİS KOÇTEKİN, AYTEN ŞİMŞEK

Derleme

- Fasiyal Doku Kalınlığı Ölçüm Teknikleri ve Önemi 125-132
AYLA KURKÇUOĞLU, E. KAYA ŞİMŞEK, YASİN ÜYEL

Olgu Sunumu

- İnvers Pittiriyazis Rozea: Nadir Bir Varyant 133-137
DİDEM DİDAR BALCI, ÇİĞDEM ASENA DOĞRAMACI, EBRU ÇELİK,
MEHMET YALDIZ, BÜLENT AKANSU
- Kartajener Sendromu 138-141
NİMET AKSEL, AYDAN MERTOĞLU, NİLÜFER ASLANKARA, AYŞE ÖZSÖZ

Yazı Dizisi

- Genç Müsabaka Sporcularında Ani Ölümler - IV 142-151
DERYA ŞENTÜRK

Tıp Dünyasından

- Tıp Dünyasından i-iv
Kongreler vi-vii
Kaybettiklerimiz... viii

Kültür - Sanat

- Tarih / Terra Cotta Savaşçıları, Çin Halk Cumhuriyeti I-IV
Kitap / Türkan VI
Röportaj / Doç. Dr. Okan Gülbahar VII-XII
El Sanatları/ Geleneksel Sanatlarımız "Tahta ve Ağaç İşçiliği" XIV-XV
Geçmiş Zaman Yaprakları XVI